Oper strip

Sutures cutanées adhésives

Composition

Non tissé en polyester et polyamide, adhésif acrylique et papier siliconé.

Présentation Oper strip

Référence	Dimensions du pansement	Unités par boîte	Boîtes par carton	Unités par carton
0037800	3 x 75 mm	50 x 5	4	1.000
0037801	6 x 75 mm	50 x 3	4	600
0037802	6 x 38 mm	50 x 6	5	1.500
0037803	6 x 100 mm	50 x 10	6	3.000
0037804	12 x 100 mm	50 x 6	6	1.800
0037805	25 x 125 mm	50 x 4	5	1.000

Caractéristiques techniques

Support	Non tissé en polyester et polyamide	**Perméabilité (MVTR)**	≥ 850 g · m^{-2} · 24 h^{-1} à 37 °C
Épaisseur du support	0,30 ± 0,05 µm	**Adhésif**	Acrylique
Couleur	Beige	**Adhérence sur l'acier**	250 - 700 g / 25 mm
Grammage	39 - 49 g / m^2	**Grammage de l'adhésif**	45 ± 5 g / m^2

Ref: 00952141
Rev: 2013-11-12

Précautions

Oper strip est un produit stérile. Ne pas utiliser si l'emballage est ouvert ou abimé. Produit à usage unique. Ne pas re-stériliser.

Contre-indications

Oper strip ne doit pas être utilisé dans les cas suivants:

- Quand la plaie est infectée.
- Si la tension de la peau est excessive.
- Les plaies de cicatrisations secondaires.
- Si l'on ne parvient pas à faire adhérer la suture correctement (excès d'exsudat, présence de graisse...).
- Les coupures profondes, sauf pour maintenir la peau du patient durant son transfert dans un centre médical.

DON'T USE IF PACKAGE IS DAMAGED · LATEX FREE · SEE INSIDE · 0318 · STERILE EO

Fabriqué et commercialisé par

Innovative Health Technologies

Iberhospitex S.A. Avda. Catalunya, 4 - 08185 Lliçà de Vall, Barcelona, Spain
Tel +34 93 843 60 34 - Fax +34 93 843 61 11 - info@iht.es - www.iht.es

Oper strip

Sutures cutanées adhésives

Hospital Care

Sutures cutanées de pose facile et rapide

Facilite la cicatrisation de la plaie, minimisant la cicatrice



Sutures cutanées avec adhésif hypoallergénique de pose facile et rapide

Oper strip

Sutures cutanées adhésives

Oper strip est un renfort qui assure la stabilité de la plaie, favorisant la cicatrisation et minimisant la cicatrice pour:

- Coupures cutanées superficielles ou semi-profondes.
- Lacérations et incisions chirurgicales.
- Renforcement des sutures traditionnelles.
- Substitut de suture après retrait des sutures traditionnelles.

Agit comme un renfort favorisant la cicatrisation

Oper strip est une suture adhésive, constituée d'un support non tissé polyester et polyamide transpirable, recouvert d'un adhésif acrylique hypoallergénique sans latex.

Il offre une grande adhésivité, une fixation sûre des bords de la plaie ainsi qu'une haute résistance aux tensions. Ne se décolle pas au contact de l'eau ni à cause de mouvements. Les bandelettes permettent un retrait atraumatique sans laisser de résidu. Oper strip peut rester en place pendant 7 jours.



Adhésif acrylique

- Sensible à la pression digitale.
- Bon comportement face aux températures (0-55 °C).
- Résistance à l'humidité.
- Perméable à la vapeur d'eau.
- Adhérence douce et stable sur la peau.
- Se retire facilement.

Haut pouvoir respirant

Procédé de production avancé. L'adhésif de nos sutures est apposé sur du non tissé de polyamide et polyester, ce qui donne une grande perméabilité à l'O_2 et à la vapeur d'eau.



Haute adhérence pour les zones en mouvement

Le non tissé de polyamide et polyester apporte une grande résistance aux tensions pour les parties du corps en mouvement: articulations, zones hautement profilées et autres parties où apparaissent généralement les œdèmes.

Couleur peau

Plus esthétiques.

Sans latex

Oper strip ne contient pas de latex.

Hypoallergénique

Oper strip ne contient aucun allergène connu ni aucune substance irritante. Testé par protocole normalisé.

Mode d'emploi

1. Laver et désinfecter de manière appropriée la plaie et son contour.
2. Sécher la plaie et son contour.
3. S'assurer qu'il ne reste plus aucun corps étranger dans la plaie.
4. Retirer le film protecteur et extraire une bande de suture, à manipuler avec les mains propres.
5. Lors de l'utilisation de ces sutures, rapprocher et joindre avec précision les bords de la plaie et placer la bande perpendiculairement à la coupure.
6. Les deux premières bandes doivent être positionnées de part et d'autre de la plaie, puis mettre les suivantes parallèlement aux premières.
7. Pour la pose, coller une extrémité de la suture sur un côté de la plaie, sans étirer. Ensuite, rapprocher les bords de la plaie et coller l'autre extrémité de la suture sur le côté opposé.
8. Le reste des sutures doivent être placé parallèlement à la première, jusqu'à couvrir toute l'étendue de la plaie.
9. Placer les sutures en laissant un espace de 2 mm à 5 mm entre elles, en fonction de la profondeur, étendue de la plaie. La distance de séparation des bandes est généralement de 2 à 3 mm.
10. Pour diminuer la tension sur la plaie, on peut placer une bande perpendiculairement de chaque côté des extrémités des sutures couvrant la coupure.
11. Il n'est pas nécessaire d'effectuer un suivi spécifique après le retrait des sutures, une fois la plaie cicatrisée, mais il est conseillé une inspection visuelle du procédé.